

MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ¹ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

FORMATO DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA IPS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA CON ENFOQUE INTEGRAL -IAMII

OBJETIVO DE LA VIS	por cada Paso de la		nto de Procesos prioritario Estrategia IAMI en la IPS en el Departamento y brinda fortalecer la estrategia.	
FECHA:	Septiembre 24 y 25 de 2019		HORA:	9:10 a.m.
LUGAR:	Hospital San Juan Bautista - Chaparral			
REDACTADA POR:	Melva Ortíz Santos, Profesional de Apoyo de la Secretaría de Salud del Tolima (SST).		la Secretaría de	

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
LUZ MERY MONTERO AMAYA	Coordinadora IAMII	Hospital San Juan Bautista
MELVA ORTÍZ SANTOS	Profesional de Apoyo SST	Secretaría de Salud del Tolima

ORDEN DEL DIA:

El cronograma desarrollado en la Visita de Verificación del cumplimiento de Procesos prioritarios por cada Paso de la Estrategia IAMI en la IPS acreditada como IAMI, se ve reflejado en el desarrollo de la presente visita.

DESARROLLO DE LA ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA:

EPS autorizadas en el municipio y con contrato con el Hospital: Nueva EPS, Medimás, Pijao Salud, Salud Vida, Comparta, Eccopsos, Asmet Salud y Policia

1. REUNION INICIAL CON FUNCIONARIOS IAMII

En la reunión inicial se contó con la participación de la Enfermera Jefe Luz Mery Montero Amaya, a quien se informa el objeto de la visita y en forma seguida, se inicia el proceso de verificación del cumplimiento de Procesos prioritarios por cada uno de los Pasos de la Estrategia IAMI.

- 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS PRIORITARIOS POR CADA UNO DE LOS PASOS DE LA ESTRATEGIA IAMII
 - 2.1. Disponer de una política institucional para la promoción, protección, atención y apoyo en salud y nutrición a la población materna e infantil.



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ² de 23

Vigente desde: 13/12/2011

DESCRIPCION (11 criterios)	CUM	PLIM	COMENTARIOS
POLITICA	SI	NO	
Elaborada y firmada	Χ		
Incluida de manera explícita en el	Χ		
Plan de Desarrollo Institucional			
Resolución	Χ		No 143 del 27 de Febrero de 2018
Socialización de la política	Χ		
Comité con presencia de la	Χ		
comunidad			D 17 Jul 40 de Marro do 2040
Reuniones periódicas del Comité		X	Reunión del 12 de Marzo de 2019. Frecuencia establecida bimensual
Archivo de actas firmadas	Χ		
Datos generales actualizado	Χ		
Autoapreciación actualizado	Χ		
Plan de mejoramiento institucional		X	
Diligenciamiento Formato "Cumplimiento 10 Pasos IAMII" (semaforización)		X	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 1: 72,7%

CONVENCIONES.

80 - 100% Color Verde 60 - < 80% Color Amarillo Menor 60% Color Rojo

2.2. Capacitar a todo el personal que atiende la población materna e infantil, de tal forma que esté en condiciones de poner en práctica la política IAMII institucional de salud y nutrición en favor de la mujer y la infancia.

DESCRIPCION (12 criterios) CAPACITACIÓN Dx del personal de la institución Elaboración del Plan de capacitación con los contenidos para cada grupo. Cronograma para los diferentes tipos de educación con los temas específicos. Avances en la ejecución del plan X de capacitación lnducción periódica sobre IAMII al personal nuevo Actualización al personal X	NO
---	----



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ³ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

asistencial técnicas consejería. Capacitación certificada, incluida Χ práctica en servicio en temas de la política IAMII. Se brinda entrenamiento práctico X al personal de salud, incluidas las técnicas de consejería, para ofrecer ayuda efectiva en lactancia (técnicas materna amamantamiento, valoración oral motora. extracción manual. almacenamiento, conservación y ofrecimiento de leche materna,

MACROPROCESO:

Se evalúa cumplimiento del personal asistencial y administrativo a la capacitación y proceso de información (80%)

Evaluación de la apropiación del X conocimiento en los 4 tipos de educación.

El Curso de INFORMACION se X realiza cada 6 meses.

El curso de educación a los X grupos de Apoyo se realiza semestralmente.

X

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 2: 83,3%

CONVENCIONES:

entre otros).

80 - 100% Color Verde 60 - < 80% Color Amarillo Menor 60% Color Rojo

2.3. Brindar a las mujeres gestantes y sus familias, educación y atención oportuna y pertinente para que puedan vivir satisfactoriamente su gestación, prepararse para el parto, el puerperio, la lactancia materna y la crianza.

H.C. revisada: 1106790968 Ecoopsos; No 1007818446

DESCRIPCION CU
ATENCIÓN PRENATAL (26 criterios) SI

CUMPLIM. SI NO NA **COMENTARIOS**

Mecanismos de coordinación con EPS X y Entes territoriales para asistencia al

Los gestores de las EPS verifican seguimiento a la



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ⁴ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

CPN antes de las 10 semanas

demanda inducida y a través del PIC se canaliza a las gestantes

la atención. Filas X Calidad de preferenciales, trato amable. Acompañamiento al control prenatal (2 X sillas). Registro en la H.C. H.C. prenatal completa con enfoque X de riesgo. Asesoríar sobre opciones durante el X embarazo: Información sobre IVE (Sentencia C355 de 2006) Diligenciamiento carne materno y X explicaciones de su contenido Laboratorios completos con entrega oportuna de resultados al primer control: Urocultivo y Antibiograma, X Hemograma y Hemoclasificación, Glicemia, prueba rápida VIH, prueba para treponémica rápida Sífilis, Antígeno de superficie para Hepatitis B, Pruebas de IgG para Rubeola en mujeres no vacunadas previamente, antes de la semana 16, si no ha sido realizada en la etapa preconcepcional, Pruebas de IgG e IgM, en los casos en que no se conozca el estatus de infección por Toxoplasma. Ecografía: Entre las 10 semanas + 6 X días y 13 semanas +6 días. Asesoría pre y posprueba VIH. Х Х Vacunación de la gestante: Toxoide tetánico diftérico del adulto s/antecedente vacunal. Influenza estacional a partir de la semana 14. Tétano, difteria y Tos ferina acelular (Tdap) a partir de la semana 26 de gestación. Nutrición materna. Gráfica de Atalah X con su análisis. Valoración del riesgo en cada control Χ de acuerdo a la anamnesis, examen físico y paraclínicos. Remisión al gineco obstetra en caso X de riesgo.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ⁵ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

Acompañamiento durante el resto de X la gestación por el equipo de salud mental y trabajo social, en el caso de gestantes adolescentes.

MACROPROCESO:

Ordenación micronutrientes y su X adherencia.

ACIDO FÓLICO: 0,4 mg/día hasta la semana 12 para reducir riesgos de defectos del tubo neural; en alto riesgo de defectos, la dosis es de 4 mg. CALCIO: 1200 mg/día a partir de la

CALCIO: 1200 mg/día a partir de la semana 14 para disminuir el riesgo de preeclampsia.

HIERRO: a todas las gestantes de curso normal en forma rutinaria, excepto gestantes con Hb superior a 1 4 g/DI.

ATENCIONES INCLUIDAS EN EL CONTROL PRENATAL DE SEGUIMIENTO

Realización en la semana 28, las X preguntas que permiten identificar RIEGO DE DEPRESIÓN POST PARTO:

- Durante el mes pasado, ¿con frecuencia se ha sentido triste, deprimida o sin esperanza?
- Durante el mes pasado, ¿ha permanecido preocupada por tener poco interés o placer para hacer las cosas cotidianas?

Si responde positivamente a una de estas 2 preguntas, preguntar: ¿Siente que necesita ayuda?

Solicitud de los siguientes paraclínicos:

Urocultivo de seguimiento en gestantes que reciben tratamiento para bacteriuria asintomática.

Prueba rápida para VIH con asesoria en c/trimestre y en el parto.

Prueba Treponémica rápida para Sífilis (al momento de la consulta), c/trimestre.

Prueba No Treponémica (VDRL o RPR) en Sífilis gestacional y c/trimestre.

Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa, entre las semanas 24 y 28

X No se realiza Tamización para Estreptococo del Grupo B



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ⁶ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

de gestación. Hemograma en la semana 28. Tamización para estreptococo del Grupo B con cultivo rectal y vaginal. Entre semanas 35 a 37 de gestación. Prueba de Inmunoglobulina IgM para Toxoplasma, en forma mensual para las gestantes seronegativas. Hacer Prueba de **IgA** Toxoplasmosis en mujeres con IgG e IgM positiva, si la gestación es mayor a 16 semanas; en caso de ser menor realizar prueba de avidez. Ecografía obstétrica entre semana X 18 y semana 23 + 6 días. Actividades de educación individuales. X Autocuidado Signos de alarma de la gestante Χ Lactancia materna Asesoría en P.F. Importancia del Registro Civil Х Curso preparación a la maternidad y X paternidad. Entrevistas a madres, padres y

MACROPROCESO:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 3: 88,4%

Х

CONVENCIONES:

cuidadores. Odontología

> 80 – 100% Color Verde

60 - < 80% Color Amarillo Menor 60% Color Rojo

2.4. Garantizar la atención del trabajo de parto y el parto con calidad y calidez acompañada de una persona significativa para la madre, dentro de un ambiente digno y de respeto.

HC revisadas: R.N.10060273943, 10060273943 gestante

DESCRIPCION CUMPLIM. COMENTARIOS
ATENCIÓN DEL PARTO (33 SI NO NA
criterios, con uno de cesárea)
Acompañamiento al trabajo de parto X



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

X

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ⁷ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

Acompañamiento al parto

RECURSO HUMANO la X para atención del Parto:

MACROPROCESO:

- Profesional en Medicina general
- Profesional en Enfermería que acredite formación específica en atención de partos de baja complejidad pregrado, en postgrado o formación continua, expedida por una IES reconocida por el Estado y que ofrezca el programa de Enfermería.

Solicitud de paraclínicos:

- Hemoclasificación si no tuvo CPN.
- Hcto y Hb.
- Prueba treponémica rápida.
- Prueba VIH rápida
- Hbs B si no lo tiene.

Toma de signos vitales a la madre por X lo menos una vez cada hora, en el primer período del parto.

Realización máxima de 3 tactos X vaginales con el objetivo de no aumentar el riesgo de complicaciones infecciosas en el parto. Se recomienda evitar las exploraciones vaginales ante de 4 horas, excepto en mujeres con alteraciones del progreso de parto o según criterio médico.

Medir la frecuencia cardiaca fetal cada X 30 minutos durante un minuto completo, durante la fase activa del Trabajo de Parto (dilatación mayor a 6 cms y dinámica uterina regular) y luego cada 5 minutos en el periodo expulsivo.

No se realiza amniotomia, administración de oxitócicos de rutina para acortar la duración del trabajo de parto espontaneo.

Administrar líquidos orales y canalizar X vena periférica que permita en caso necesario, la administración cristaloides a chorro.(evitar Dextrosa para prevenir la hipoglicemia

Uso del Partograma (gráfica): posición X

Х

ni X



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ⁸ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

materna, S.V. maternos, frecuencia cardiaca fetal, dilatación, borramiento, estación, estado de las membranas. variedad de posición de presentación junto con la frecuencia, duración e intensidad de contracciones uterinas y métodos empleados para el alivio del dolor durante el trabajo de parto.

MACROPROCESO:

No se realiza de forma rutinaria X presión fúndica para acelerar el expulsivo (maniobra de Kristeller). Del mismo modo, la episiotomía no está indicada de forma rutinaria.

Manejo activo del alumbramiento. RECURSO HUMANO para la Atención X del Recién Nacido:

Profesional en Medicina general con entrenamiento en adaptación y reanimación neonatal, e idealmente, que tenga vigente su formación en soporte vital avanzado neonatal. En parto de alto riesgo se requiere médico especialista en pediatría que idealmente tenga entrenamiento actualizado en adaptación reanimación neonatal.

acredite formación específica en atención de partos de complejidad en pregrado, postgrado o formación continua, expedida por una IES reconocida por el Estado y que ofrezca el programa de Enfermería.

Tiempo de pinzamiento del cordón Contacto piel a piel (tiempo)

Inicio temprano de la lactancia materna (primera hora)

En pos cesárea se realiza contacto X piel a piel y se inicia amamantamiento cuando la madre se encuentra alerta.

Hemoclasificación y TSH Identificación del recién nacido (R.N.): fecha y hora de nacimiento, nombre de la madre, # de la H.C., sexo, peso, talla y perímetro cefálico.

Х

Profesional en Enfermería baja

> Χ Χ

Χ

la manilla de identificación faltan datos de peso, talla, p. cefálico



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ⁹ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

Co entiren los quidados del condén	V
Se aplican los cuidados del cordón	^
umbilical, antibiótico oftálmico,	
vitamina K y toma de medidas	
antropométricas	
En el puerperio inmediato, se hace	X
vigilancia estricta de la hemostasia	
uterina, teniendo en cuenta los	
siguientes aspectos: Signos vitales	
maternos, Globo de seguridad,	
Sangrado genital y revisión	
episiotomía cada 15 minutos.	
Se adopta en el puerperio inmediato la	X
escala de Alerta Temprana Maternal	
Early Obstetric Warning Score	
adaptada para Colombia.	
	X
alojamiento conjunto, si no se	^
producen alteraciones en el puerperio	
inmediato.	
	V
Se realiza Tamizaje para Depresión	X
post parto con las 2 preguntas	
específicas.	V
	X
completo por profesional en medicina	
o especialista en pediatría en las	
primeras 4 horas de vida y se valora	
nuevamente antes de las 24 horas,	
previo al egreso hospitalario.	
Control en el Recién Nacido de los	X
siguientes signos vitales cada 6 horas:	
frecuencia cardiaca, frecuencia	
respiratoria, temperatura, tensión	
arterial y saturación de hemoglobina	
con pulso oximetría	
Adicionalmente, se realiza en el	X
R.N., por lo menos en una ocasión,	
pulso oximetría preductal (en	
miembro superior derecho) y post	
ductal en miembros inferiores; así	
como la toma y registro de la	
tensión arterial en las 4	
extremidades con el objeto de	
encontrar hipertensión arterial	
generalizada o de predominio en	
miembros superiores respecto a los	
miembros inferiores, como medida	
para el tamizaje de coartación	
para er tarrizaje de coartación	



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ¹⁰ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

Tamizaje aórtica. Para Cardiopatía Congénita, se considerara anormal cuando registre una diferencia mayor a 3% en la saturación de oxigeno entre estas medidas o cuando esta se encuentre en un nivel menor a 90 %.

MACROPROCESO:

Se realiza en el recién nacido Tamizaje Visual con las técnicas semiológicas básicas de inspección ocular y realización de reflejo rojo retiniano.

Se aplica el procedimiento para la X atención de una gestante con resultado positivo para VIH y/o sífilis que ingresa para atención del parto, sin los resultados de estas pruebas.

Protocolo de T. de Parto y parto libre X intervenciones innecesarias, pinzamiento oportuno del cordón umbilical, el contacto piel a piel y el inicio temprano de la lactancia materna.

protocolo incluve normas X Εl específicas para la prevención de la transmisión perinatal del VIH durante el parto.

Antes del alta, se informa sobre la forma de contactarse con los grupos de apoyo y se les remite a ellos.

Se mide el conocimiento sobre X cuidados y signos de alarma de la madre y del R.N y demás cuidados con el recién nacido (Entrevista).

Х

Х

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 4: 75,7%

CONVENCIONES:

80 - 100%Color Verde 60 - <80 % Color Amarillo

Menor 60 % Color Rojo

Ofrecer orientación y ayuda efectiva a las madres, padres y otros 2.5. cuidadores sobre la promoción, protección y atención en salud y nutrición de las madres y de las niñas y niños recién nacidos durante el pos parto.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ¹¹ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

DESCRIPCION CUMPLIM. ATENCIÓN DEL POSPARTO (14 SI NO NA criterios)

Importancia de la nutrición durante la X lactancia.

MACROPROCESO:

Técnicas de consejería para el X amamantamiento, técnica de extracción manual y conservación de la leche materna.

Se cuenta con un mecanismo X establecido para asesorar a las madres con resultado VIH + sobre el cuidado de la salud y la nutrición de ellas y de su hijo/a e informarles sobre la importancia del control médico y nutricional periódico.

Información sobre promoción de la X salud y la nutrición relacionados con su puerperio.

Se aplica al R.N. los biológicos X s/esquema de vacunación: una dosis de vacuna BCG contra la TBC antes del egreso hospitalario y hepatitis B. En el caso de tratarse de hijo de madre con hepatitis B, se dará atención por pediatría.

Se garantiza el reporte del TSH para X el control del R.N.

Detección de los problemas X tempranos del amamantamiento mediante la observación y diligenciamiento durante la estancia de atención del parto, de la FICHA DE OBSERVACIÓN DEL AMAMANTAMIENTO a las 6 horas

post parto y antes del egreso.

Se asesora sobre anticoncepción y se X provee los anticonceptivos antes del alta hospitalaria con una cobertura de al menos 3 meses, siempre con la orden de control ambulatorio de acuerdo con el método elegido.

Se da de Alta Hospitalaria a las 24 X horas de un parto vaginal y de 48 horas después de una cesárea como mínimo.

COMENTARIOS



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Χ

Código: FOR-DE-002

Versión: 02
Pág. ¹² de 23

Vigente desde: 13/12/2011

Se da cita para el control del posparto y del R.N. entre el 3 y 5 día de pos parto

MACROPROCESO:

Se expide el Certificado de Nacido X Vivo.

Se garantiza o promueve el registro civil del R.N.

Hace entrega por escrito de las X recomendaciones dadas al egreso institucional que incluyan temas sobre: autocuidado materno, signos de alarma para las puérperas y sus recién nacidos, lactancia materna exclusiva y a libre demanda, extracción manual y conservación de la leche materna, primeras vacunas, sueño seguro y vínculo afectivo, deposiciones, lctericia, palidez o cianosis, Piel y muñón umbilical..

Entrega del carne materno e infantil X

completamente diligenciados.

Falta registro en la H.C.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 5: 92,8%

CONVENCIONES:

80 – 100 % Color Verde

60 - < 80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

2.6. Promover, proteger y dar apoyo efectivo a las madres y sus familias para poner en práctica la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y con alimentación complementaria adecuada hasta los dos años de edad o más.

DESCRIPCION

CUMPLIM

NO

COMENTARIOS

LACTANCIA MATERNA (23 SI criterios)

Información sobre beneficios de la X leche materna e importancia del calostro.

Ayuda efectiva lactancia materna X exclusiva, sin suministrarle agua, ni ninguna otra bebida

Educación sobre técnica de lactancia X materna

Educación sobre lactancia materna a X libre demanda (no mayor a 3 horas)

Educación sobre extracción manual, X



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ¹³ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

conservación de la leche materna y administración con taza o cucharita. Apoyo a madres que trabajan o X estudian para mantener la lactancia materna exclusiva en las diferentes consultas que se realizan. Explicación sobre riesgos y forma de X identificar la malnutrición en los menores de 2 años Orientación sobre alimentación X complementaria y pautas para lograr alimentación perceptiva. En el control de C. y D. se hace X seguimiento sistemático а comprensión y a la forma como están poniendo en práctica los mensajes sobre alimentación complementaria. No promoción de ningún tipo de X alimento artificial contemplado en la normatividad vigente. Las fórmulas artificiales o alimentos X complementarios sugeridos menores de 2 años de edad, se prescriben con el mismo proceso que se realiza para un medicamento v en casos claramente definidos en los protocolos. No se acepta donaciones de X material alimentos. educativo. biberones, chupos, obsequios o productos que desestimulen la lactancia materna. Cumplimiento requisitos sala de Х lactancia, en cuanto a localización y dimensiones de la sala. Cumplimiento requisitos sala de Х lactancia, en cuanto a ventilación, iluminación, condiciones de pisos y paredes e instalaciones eléctricas. La Sala de lactancia cuenta con Х lavamanos. La Sala de lactancia cuenta con Х mesón o mesa de apoyo de fácil desinfección. La Sala cuenta con nevera X congelador amplia, para que los recipientes se guarden de forma



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ¹⁴ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

vertical y su respectivo termómetro. La sala cuenta con sillas con X espaldar y apoya brazos de fácil La sala cuenta con diferentes tipos Χ de canecas plásticas con tapa de accionamiento no manual, con sus respectivas bolsas para residuos sólidos. La Sala cuenta con jabón líquido Χ para manos, toallas de papel. La Sala cuenta con cinta de Х enmascarar y bolígrafo. Se lleva control del registro de Χ temperatura de la nevera de la Sala de Lactancia Materna. Se lleva registro diario de la Χ utilización de la Sala.

MACROPROCESO:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 6: 60,8%

CONVENCIONES:

80 – 100 % Color Verde 60 - < 80% Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

2.7. Favorecer el alojamiento conjunto de la madre y el niño o niña incluso en caso de hospitalización de alguno de los dos.

DESCRIPCION	CUMPLIM.	COMENTARIOS
ALOJAMIENTO CONJUNTO (4	SI NO NA	
criterios, con uno U.C. Intensivo)		
Se ofrece alojamiento conjunto y/	X	
cohabitación, aun en casos de		
hospitalización de alguno de los dos.		
Acompañamiento del niño	X	
hospitalizado en condiciones dignas.		
(condiciones de comodidad)		
Se permite la presencia sin	Х	
restricciones de la madre del padre o		
de un familiar en caso de hospitalización de niños/as		
Tiene horarios flexibles para permitir	Y	
que la madre o el padre acompañen a	^	
sus hijos en la unidad de cuidado		
intensivo neonatal o pediátrica.		



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ¹⁵ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 7: 100%

CONVENCIONES:

80 – 100 % Color Verde

MACROPROCESO:

60 - < 80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

2.8. Proveer atención integral en salud y nutrición a todas las niñas y niños menores de seis años asegurando el seguimiento dinámico del crecimiento y el desarrollo.

H.C. revisadas: 1106791591.

DESCRIPCION	CU	MPLIM.		COMENTARIOS
ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS/AS (22 criterios)	SI	NO	NA	
Se aplica protocolo de atención para	Χ			
favorecer el desarrollo de C. y D Mecanismo establecido de coordinación con ente territorial, EPS y su red, que permita recibir intervención integral oportuna de los niños con alteraciones en su estado nutricional.	X			
Mecanismo establecido de coordinación con ente territorial, EPS y su red, que permita recibir intervención integral oportuna de los niños víctimas o en riesgo de maltrato.	X			
Durante los controles, las consultas y/o hospitalización, se efectúa seguimiento dinámico y sistemático del crecimiento y desarrollo según los estándares adoptados.		X		
Los equipos para la medición antropométrica de los recién nacidos, menores de 5 años y gestantes en todos los servicios de atención de esta población, reúnen las condiciones técnicas consideradas en la Resolución 2465 de 2016	X			
Durante el control de C. y D., las consultas y/o hospitalización, se revisa y diligencia sistemáticamente el carne de salud infantil.		Х		
Se orienta a los padres y cuidadores sobre como iniciar la alimentación complementaria adecuada	X			



Χ

Х

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02
Pág. 16 de 23

Vigente desde: 13/12/2011

(perceptiva)

Se efectúa remisión durante la X atención infantil, al detectarse alteraciones en el crecimiento y desarrollo y se hace seguimiento a la remisión

MACROPROCESO:

En el control de C. y D. se pone X especial atención a la desparasitación periódica y a la suplementación con micronutrientes.

Se evalúa la alimentación y nutrición y X en caso de ser dx con anemia o malnutrición, se remiten, se hace seguimiento y se registra en la H.C.

Vacunación según esquema.

Atención en salud bucal.

Educación: prevención de accidentes, lactancia materna, alimentación complementaria, signos de alarma, etc.

Educación sobre desventajas del X chupo y biberón.

En caso de enfermedad se brinda X información oportuna sobre cómo tratar la enfermedad, importancia de la alimentación, frecuencia de la alimentación durante la convalecencia, sin suspender lactancia materna y mantener actividades que favorezcan el desarrollo infantil temprano

Se utiliza en c/consulta los siguientes **Instrumentos obligatorios**: Escala Abreviada de Desarrollo -3, tablas y gráficas de los patrones de referencia para clasificación nutricional, cuestionario VALE y Apgar Familiar.

Toma de S.V. incluyendo saturación de oxigeno con pulso oximetría. La T.A. debe tomarse a todos los niños mayores de 3 años de edad a o a los menores de esta edad, si tienen síntomas recurrentes de cualquier tipo o antecedentes de cateterización umbilical en el periodo neonatal.

Valoración de la salud visual: realizar examen oftalmoscópico para explorar y evaluar las estructuras del segmento

Se aplica AIEPI

X Se aplica la Escala abreviada del Desarrollo 2. No se aplica el cuestionario VALE, ni el Apgar Familiar.

Χ

Х



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ¹⁷ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

anterior y posterior; así mismo, indagar sobre preocupaciones de los padres sobre problemas visuales del niño/a.

MACROPROCESO:

Valorar la agudeza visual a partir de los 3 años de edad usando optotipos morfoscópicos o angulares. Remisión ante alteraciones.

Si no se cuenta con el Tamizaje Auditivo Neonatal se debe garantizar su toma en los primeros tres (3) meses de vida.

Mecanismos verificables para hacer X seguimiento a padres y cuidadores sobre adherencia a recomendaciones y educación (entrevistas y seguimiento en cada control)

Los niños atendidos por consulta X externa o urgencias son valorados en forma integral

Se brinda información sobre la existencia de los grupos de apoyo y se les remite a ellos.

Х

X Se realiza pero no se registra en H.C.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 8:68,1%

CONVENCIONES:

comprensible.

80 – 100 % Color Verde 60 - < 80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo

2.9. Garantizar atención con calidad y calidez en todos sus servicios partiendo del reconocimiento de las usuarias y usuarios de los servicios como sujetos de derechos, promoviendo siempre el respeto a la diferencia, la participación y el trato digno para toda la población.

CUMPLIM

ATENCION CON CALIDAD (18 SI NO criterios) Identificación de pacientes y X trabajadores. Señalización de las áreas de la X IPS en lenguaje sencillo y

Infraestructura adecuada X (rampas, pasamanos, pisos antideslizantes.

DESCRIPCION

Baños higiénicos y apropiados, X con elementos para lavado de manos.

COMENTARIOS



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ¹⁸ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

Los servicios están debidamente X iluminados y aireados. Dotación básica para garantizar la X comodidad en salas de espera, servicios de consulta externa, hospitalización y urgencias Disponer de juguetes y/o ludoteca X en salas de espera y/o en áreas de hospitalización Cuenta con material que no hace X alusión a ninguna empresa en especial (rotafolios, afiches, modelos de bebes, de glándulas mamarias, de tazas, curvas de crecimiento, tallimetros, hojas de prescripción médica, entre otros) Cuenta con mecanismos que X faciliten la atención oportuna, preferencial y no discriminatoria. Protocolo atención prenatal. Falta actualización s/Resolución Х 3280 de 2018 Protocolo de atención del parto. Χ Falta actualización s/Resolución 3280 de 2018 Falta actualización s/Resolución Protocolo de atención del recién 3280 de 2018 nacido. Falta actualización s/Resolución Χ Protocolo del puerperio 3280 de 2018 Protocolo de manejo de residuos X hospitalarios Verificación sistemática de la X comprensión en la educación. Entrevistas a usuarios Х Oportunidad en la atención Х mecanismos X Cuenta con efectivos de seguimiento a las remisiones que se hacen de la población materna e infantil atendida.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 9: 77,7%

CONVENCIONES:

80 – 100 % Color Verde 60 - < 80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ¹⁹ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

2.10. Disponer de mecanismos y estrategias de apoyo institucional y comunitario que favorezcan la continuidad de las acciones más allá de los servicios institucionales, con el fin de favorecer la salud y la nutrición materna e infantil.

DESCRIPCION CUIDADO EXTRAINSTITUCIONAL (8 criterios)	CUMPLIM SI NO	COMENTARIOS
Existencia de grupos de apoyo intrainstitucionales.	Χ	
Existencia de grupos de apoyo extrainstitucionales.	X	
Capacitación y actualización a los grupos de apoyo.	X	2 actualizaciones
Participación de los grupos de apoyo y/o redes de apoyo en el Comité IAMII.	Х	
Cuenta con mecanismos de apoyo y seguimiento (ambientes de extracción de leche materna y/o bancos de leche humana, línea amiga, visitas domiciliarias, agentes de salud, equipos extramurales) para favorecer madres, niñ@s después de salir de la institución.	X	
Existencia y publicación del directorio de los grupos de apoyo.	X	
Se remite a la gestante, puérpera y menores pos hospitalizados a las redes de apoyo y se solicita retroalimentación.	Х	
Se tiene en cuenta las propuestas de los grupos/redes de apoyo para el mejoramiento de la atención en salud y se coordinan con ellos actividades que la promuevan.	X	
DODCENTA IE E		IENTO DACO 40.4000/

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PASO 10:100%

CONVENCIONES:

80 – 100 % Color Verde 60 - < 80 % Color Amarillo Menor 60 % Color Rojo



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ²⁰ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

3. **REUNION FINAL**

MACROPROCESO:

Se hace entrega del informe IAMII en forma verbal y por escrito a la Enfermera jefe Luz Mery Montero Amaya y se recomienda su socialización y gestión para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento.

COMPROMISOS Y TAREAS				
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSAB	PLAZO CUMPLIM	OBSERVACIO	
Contar en el comité IAMII con presencia de la comunidad que se reúne periódicamente, documentado a través de actas, el cual es responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades que se desarrollan para hacer operativa la política.	Comité IAMII	A partir de la fecha		
Contar con un Plan de Mejoramiento donde se incluya los resultados de la autoapreciación, el seguimiento a los indicadores de los datos generales, así como las preevaluaciones y sus análisis.	Comité IAMII	A partir de la fecha		
Diligenciar el Formato "Cumplimiento 10 Pasos IAMII" (semaforización) teniendo en cuenta el Formulario de Autoapreciación.	Comité IAMII	A partir de la fecha		
Contar con un mecanismo de capacitación certificada, permanente (incluida la práctica en servicio y/o la revisión de casos, revista clínica, entre otros) para que todo el personal esté actualizado en los temas establecidos en la política de IAMII.	Comité IAMII	A partir de la fecha		
Describir o establecer un mecanismo a través del cual la institución se asegura que más del 80% de los funcionarios/as ha recibido capacitación en la implementación y sostenibilidad de la IAMII e ir evaluando su cumplimiento.	Comité IAMII	A partir de la fecha		
Solicitar en los Controles prenatales subsiguientes los siguientes paraclínicos: Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa, entre las semanas 24 y 28 de gestación. Hemograma en la semana 28.	Comité IAMII	A partir de la fecha	·	



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ²¹ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

Tamización para estreptococo del Grupo B con cultivo rectal y vaginal. Entre semanas 35 a 37 de gestación. En el Control Prenatal: Garantizar a todas las gestantes y madres atendidas en la institución, y a sus parejas, la información y consejería en planificación, brindando información sobre el uso de preservativos y su entrega para la prevención de las ITS (sífilis gestacional y congénita) VIH y la Hepatitis B; durante la gestación y el periodo de la lactancia materna. Efectuar el registro en la H.C. En el Control Prenatal: Brindar educación sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia de la madre, con los siguientes datos:
Entre semanas 35 a 37 de gestación. En el Control Prenatal: Garantizar a todas las gestantes y madres atendidas en la institución, y a sus parejas, la información y consejería en planificación, brindando información sobre el uso de preservativos y su entrega para la prevención de las ITS (sífilis gestacional y congénita) VIH y la Hepatitis B; durante la gestación y el periodo de la lactancia materna. Efectuar el registro en la H.C. En el Control Prenatal: Brindar educación sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
En el Control Prenatal: Garantizar a todas las gestantes y madres atendidas en la institución, y a sus parejas, la información y consejería en planificación, brindando información sobre el uso de preservativos y su entrega para la prevención de las ITS (sífilis gestacional y congénita) VIH y la Hepatitis B; durante la gestación y el periodo de la lactancia materna. Efectuar el registro en la H.C. En el Control Prenatal: Brindar educación sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
las gestantes y madres atendidas en la institución, y a sus parejas, la información y consejería en planificación, brindando información sobre el uso de preservativos y su entrega para la prevención de las ITS (sífilis gestacional y congénita) VIH y la Hepatitis B; durante la gestación y el periodo de la lactancia materna. Efectuar el registro en la H.C. En el Control Prenatal: Brindar educación sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
institución, y a sus parejas, la información y consejería en planificación, brindando información sobre el uso de preservativos y su entrega para la prevención de las ITS (sífilis gestacional y congénita) VIH y la Hepatitis B; durante la gestación y el periodo de la lactancia materna. Efectuar el registro en la H.C. En el Control Prenatal: Brindar educación sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
y consejería en planificación, brindando información sobre el uso de preservativos y su entrega para la prevención de las ITS (sífilis gestacional y congénita) VIH y la Hepatitis B; durante la gestación y el periodo de la lactancia materna. Efectuar el registro en la H.C. En el Control Prenatal: Brindar educación sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
información sobre el uso de preservativos y su entrega para la prevención de las ITS (sífilis gestacional y congénita) VIH y la Hepatitis B; durante la gestación y el periodo de la lactancia materna. Efectuar el registro en la H.C. En el Control Prenatal: Brindar educación sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
y su entrega para la prevención de las ITS (sífilis gestacional y congénita) VIH y la Hepatitis B; durante la gestación y el periodo de la lactancia materna. Efectuar el registro en la H.C. En el Control Prenatal: Brindar educación sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
(sífilis gestacional y congénita) VIH y la Hepatitis B; durante la gestación y el periodo de la lactancia materna. Efectuar el registro en la H.C. En el Control Prenatal: Brindar educación sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
Hepatitis B; durante la gestación y el periodo de la lactancia materna. Efectuar el registro en la H.C. En el Control Prenatal: Brindar educación sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
periodo de la lactancia materna. Efectuar el registro en la H.C. En el Control Prenatal: Brindar educación sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
el registro en la H.C. En el Control Prenatal: Brindar educación sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
En el Control Prenatal: Brindar educación sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
sobre el Registro Civil y mecanismo para que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
que el bebe disponga de este registro. Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
Hacer la correspondiente anotación en la H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
H.C. En la atención del Trabajo de PARTO y Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
Parto: Permitir a las mujeres en el parto, la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
la compañía del compañero o de una persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
persona significativa. Efectuar registro en la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a identificar al Recién Nacido en presencia
la H.C. En la atención del PARTO: Proceder a Comité IAMII identificar al Recién Nacido en presencia A partir de la fecha
identificar al Recién Nacido en presencia fecha
identificar al Recién Nacido en presencia fecha
fecha y hora de nacimiento, nombre de la
madre, # de la H.C., sexo, peso, talla y
perímetro cefálico. Efectuar registro en la
H.C.
En el puerperio inmediato, adoptar la Comité IAMII A partir de la
escala de Alerta Temprana Maternal Early
Obstetric Warning Score adaptada para
Colombia.
Realizar Tamizaje para Depresión post Comité IAMII A partir de la
parto con las 2 preguntas específicas,
antes del egreso por la atención del parto.
Durante el último mes se ha
preocupado porque con frecuencia se
siente triste, deprimida o sin
esperanza?
Durante el último mes se ha
preocupado porque con frecuencia
sentía poco interés por realizar
actividades y además no sentía que le
proporcionaran placer?
Ante respuesta positiva a una de estas



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. ²² de 23

Vigente desde: 13/12/2011

preguntas hacer acompañamiento por			
Psicología y Psiquiatría para Dx			
confirmatorio y apoyo terapéutico (Aplicar			
escala de depresión posnatal de			
Edimburgo).			
Controlar en el recién nacido los	Comité IAMII	A partir de la	
siguientes signos vitales cada 6 horas:		fecha	
frecuencia cardiaca, frecuencia			
respiratoria, temperatura, tensión arterial			
y saturación de hemoglobina con pulso			
oximetría.			
Realizar en el R.N., por lo menos en	Comité IAMII	A partir de la	***************************************
una ocasión, pulso oximetría preductal		fecha	
(en miembro superior derecho) y post		7007.0	
ductal en miembros inferiores; así			
como la toma y registro de la tensión			
arterial en las 4 extremidades con el			
objeto de encontrar hipertensión arterial			
generalizada o de predominio en			
miembros superiores respecto a los			
miembros inferiores, como medida para el	:		
tamizaje de coartación aórtica y de			
cardiopatía congénita.			
Realizar en el recién nacido Tamizaje	Comité IAMII	A partir de la	
Visual con las técnicas semiológicas	Oomite Pavili	fecha	
básicas de inspección ocular y realización		lecha	
de reflejo rojo retiniano.			
En la atención del PARTO: Antes del alta,	Comité IAMII	A partir de la	
informar sobre la forma de contactarse	Comite iAivin	fecha	
con los grupos de apoyo y efectuar la		·	
remisión correspondiente. Hacer el			
·			
registro en la H.C. En la ATENCIÓN DEL PUERPERIO,	Comité IAMII	A partir de la	
	Connice iAivin	fecha	
		IECHA	
Contar con estrategias verificables que			
garanticen el registro civil del recién			
nacido o, tener mecanismos de			
coordinación para facilitar el trámite a sus			
usuarias y usuarios inmediatamente			
después de ser dados de alta. Efectuar			
registro en la H.C.	0	A ====================================	
Dar cumplimiento a los requisitos	Comité IAMII	A partir de la	
establecidos en la Resolución No 2423		fecha	
del 8 de Junio de 2018, relacionada con			
las parámetros técnicos para la operación			
de la sala de lactancia o sala de			
I .	1	1	1



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02 Pág. ²³ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

extracción de leche materna. Disponer de mecanismos incluidos en los Comité IAMII A partir de la parámetros de calidad que favorezcan fecha condiciones de comodidad a las madres o acompañantes de las niñas y niños hospitalizados y en el servicio de urgencias. (sofá cama) En la Atención Infantil por Morbilidad Comité IAMII A partir de la (CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS) fecha HOSPITALIZACIÓN): seguimiento dinámico y sistemático del crecimiento y desarrollo según los estándares adoptados por el país y el marco de la política de primera infancia. Efectuar registro en la H.C. En la Atención Infantil de C. y D., por Comité IAMII A partir de la Morbilidad (CONSULTA EXTERNA Y fecha URGENCIAS) Y HOSPITALIZACIÓN): Revisar y diligenciar sistemáticamente el carné de salud infantil y efectuar el registro en la H.C. Utilizar en c/consulta de la Atención Comité IAMII A partir de la Integral en la Primera Infancia, los fecha siguientes Instrumentos obligatorios: Escala Abreviada de Desarrollo -3, tablas y gráficas de los patrones de referencia para clasificación nutricional, cuestionario VALE y Apgar Familiar. S.V. incluyendo En C. y D. Tomar Comité IAMII A partir de la saturación de oxigeno con pulso fecha oximetría. La T.A. debe tomarse a todos los niños mayores de 3 años de edad a o a los menores de esta edad, si tienen síntomas recurrentes de cualquier tipo o antecedentes de cateterización umbilical en el periodo neonatal. En C. y D. se realiza la Valoración de la Comité IAMII A partir de la salud visual: examen oftalmoscópico fecha para explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior; así mismo. indagar sobre preocupaciones de los padres sobre problemas visuales del niño/a. Valorar la agudeza visual a partir de los 3 años de edad usando optotipos morfoscópicos o angulares. Remisión ante alteraciones.



MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FOR-DE-002

Versión: 02
Pág. ²⁴ de 23

Vigente desde: 13/12/2011

Garantizar el Tamizaje Auditivo durante la atención integral en la primera infancia, si no se cuenta con el Tamizaje Auditivo Neonatal en los primeros tres (3) meses de vida.		A partir de la fecha
En la atención Infantil, con énfasis en la primera infancia.: Informar a los padres y/o cuidadores sobre la forma de contactarse con los grupos de apoyo y efectuar la remisión correspondiente. Hacer el registro en la H.C.		A partir de la fecha
Contar con los protocolos actualizados y socializados de: Atención prenatal, Atención del parto, Atención del recién Nacido y atención del puerperio.	Comité IAMII	A partir de la fecha

Como constancia, se firma por los asistentes el 25 de Septiembre de 2019, en el municipio de Chaparral.

NOMBRE /	CARGO	FIRMA Q
1/12 /61 Sportus	Educo,	1
John On S	Presional de 14	1010 1 1/2 CAT
7	y and ar my	Jan Cal



